
Resumen de la evolución de las precipitaciones en España

Fecha de elaboración 5 de noviembre de 2026


Precipitación semanal

Durante el periodo comprendido entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre, las precipitaciones afectaron principalmente al litoral mediterráneo peninsular, a la cornisa cantábrica y a ambos archipiélagos. Se superaron los 20 mm en zonas del litoral de Cataluña y de la Comunitat Valenciana, con acumulados localmente superiores a 60 mm en las provincias de Barcelona y Alicante. En Canarias, las precipitaciones se concentraron principalmente en las islas occidentales, con acumulados superiores a 60 mm en puntos de La Palma y a 20 mm en zonas de Tenerife, La Gomera y El Hierro, mientras que en Gran Canaria las cantidades fueron más modestas. Entre las precipitaciones acumuladas en los observatorios principales destacan las siguientes: 82 mm en La Palma/Aeropuerto, 45 mm en Barcelona/Aeropuerto, 31 mm en Tenerife/Sur, 26 mm en Ibiza/Es Codolà, 23 mm en La Gomera/Aeropuerto y 22 mm en El Hierro/Aeropuerto. El día 4 de noviembre se registraron precipitaciones en la mitad oriental de la Península.



Precipitaciones en el año hidrológico

El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre de 2026 hasta el 3 de noviembre de 2026 se cifra en 53 mm, lo que representa alrededor de un 37 % menos que el valor normal correspondiente a dicho periodo (84 mm).



Las precipitaciones acumuladas presentan un marcado contraste entre el este y el oeste peninsular. Destacan los valores superiores a los normales en Cataluña y en la vertiente mediterránea, especialmente en Levante, donde se supera localmente el triple de la precipitación normal. En cambio, predominan los déficits en la mitad occidental y en amplias zonas del interior, más acusados en Galicia, Extremadura y Andalucía occidental. En Baleares destacan los superávits en Ibiza y en el oeste de Mallorca, mientras que en Menorca las precipitaciones quedan por debajo de lo normal. En Canarias la distribución es muy heterogénea: predominan los superávits en El Hierro y en buena parte de La Gomera, así como en sectores del norte y este de La Palma, del nordeste de Tenerife y Gran Canaria y del sur de Fuerteventura. En Lanzarote las precipitaciones son generalmente inferiores a las normales, aunque aparecen zonas próximas o ligeramente superiores a la normal.

***NOTA importante**: De conformidad con la Resolución 16 (Cg-17) de la OMM, en la producción climatológica de AEMET se utilizan los valores Normales Climatológicos Estándares para el período 1991-2020, elaborados en el Área de Climatología y Aplicaciones Operativas de AEMET.*